

- = Заболевание собаки будет влиять на ежедневный образ жизни
- = Необходимо противосудорожное лечение в большинстве случаев пожизненное
- = Важно ведение детального дневника состояния здоровья собаки
- = Цель противосудорожного лечения - стабилизация состояния собаки для достижения оптимального контроля приступов
- = Лечение противосудорожными препаратами необходимо корректировать
- = Коррекция дозы ПС должна выполняться только после консультации с ветеринаром
- = Внезапная отмена лекарственного препарата может быть опасна
- = Лекарственные взаимодействия могут встречаться при комбинировании с другими противосудорожными и непротивосудорожными препаратами
- = Побочные эффекты противосудорожного лечения нужно нивелировать приемом других медицинских препаратов
- = Диета (например содержание соли), понос и рвота могут влиять на абсорбцию противосудорожного препарата. Желательно сохранять диету постоянной или делать изменения постепенно и обращаться к ветеринару, если наблюдаются желудочно-кишечные симптомы.
- = Важно регулярно контролировать концентрацию противосудорожного препарата в крови, и показатели общего и биохимического анализов крови
- = Возможность появления эпилептического статуса и кластерных судорожных приступов и назначения дополнительных противосудорожных препаратов
- = Расходы, связанные с лечением, станут заметной статьей семейного бюджета

- =Заблевание собаки будет влиять на ежедневный образ жизни
- =Необходимо противозипептическое лечение в большинстве случаев пожизненное
- =Важно ведение детального дневника состояния здоровья собаки
- =Цель противозипептического лечения - стабилизация состояния собаки для достижения оптимального контроля эиприступов
- =Лечения противосудорожными препаратами необходимо корректировать
- =Коррекция дозы ПС должна выполняться только после консультации с ветеринаром
- =Внезапная отмена лекарственного препарата может быть опасна
- =Лекарственные взаимодействия могут встречаться при комбинировании с другими противозипептическими и непротивозипептическими препаратами
- =Побочные эффекты противозипептического лечения нужно нивелировать приемом других медицинских препаратов
- =Диета (например содержание соли), понос и рвота могут влиять на абсорбцию противозипептического препарата. Желательно сохранять диету постоянной или делать изменения постепенно и обращаться к ветеринару, если наблюдаются желудочнокишечные симптомы.
- =Важно регулярно контролировать концентрацию противозипептического препарата в крови, и показатели общего и биохимического анализов крови
- =Возможность появления эипептического статуса и кластерных судорожных припадков и назначения дополнительных противозипептических препаратов
- =Расходы, связанные с лечением, станут заметной статьей семейного бюджета

- =Заболевание собаки будет влиять на ежедневный образ жизни
- =Необходимо противоэпилептическое лечение в большинстве случаев пожизненное
- =Важно ведение детального дневника состояния здоровья собаки
- =Цель противоэпилептического лечения - стабилизация состояния собаки для достижения оптимального контроля эпилептических приступов
- =Лечения противосудорожными препаратами необходимо корректировать
- =Коррекция дозы ПС должна выполняться только после консультации с ветеринаром
- =Внезапная отмена лекарственного препарата может быть опасна
- =Лекарственные взаимодействия могут встречаться при комбинировании с другими противоэпилептическими и непротивоэпилептическими препаратами
- =Побочные эффекты противоэпилептического лечения нужно нивелировать приемом других медицинских препаратов
- =Диета (например содержание соли), понос и рвота могут влиять на абсорбцию противоэпилептического препарата. Желательно сохранять диету постоянной или делать изменения постепенно и обращаться к ветеринару, если наблюдаются желудочнокишечные симптомы.
- =Важно регулярно контролировать концентрацию противоэпилептического препарата в крови, и показатели общего и биохимического анализов крови
- =Возможность появления эпилептического статуса и кластерных судорожных припадков и назначения дополнительных противоэпилептических препаратов
- =Расходы, связанные с лечением, станут заметной статьей семейного бюджета

- = Заболевание собаки будет влиять на ежедневный образ жизни
- = Необходимо противоэпилептическое лечение в большинстве случаев пожизненное
- = Важно ведение детального дневника состояния здоровья собаки
- = Цель противоэпилептического лечения - стабилизация состояния собаки для достижения оптимального контроля эпилептических приступов
- = Лечение противосудорожными препаратами необходимо корректировать
- = Коррекция дозы ПС должна выполняться только после консультации с ветеринаром
- = Внезапная отмена лекарственного препарата может быть опасна
- = Лекарственные взаимодействия могут встречаться при комбинировании с другими противоэпилептическими и непротивоэпилептическими препаратами
- = Побочные эффекты противоэпилептического лечения нужно нивелировать приемом других медицинских препаратов
- = Диета (например содержание соли), понос и рвота могут влиять на абсорбцию противоэпилептического препарата. Желательно сохранять диету постоянной или делать изменения постепенно и обращаться к ветеринару, если наблюдаются желудочно-кишечные симптомы.
- = Важно регулярно контролировать концентрацию противоэпилептического препарата в крови, и показатели общего и биохимического анализов крови
- = Возможность появления эпилептического статуса и кластерных судорожных припадков и назначения дополнительных противоэпилептических препаратов
- = Расходы, связанные с лечением, станут заметной статьей семейного бюджета